

***** 定期予防接種一覧(接種対象年齢内であれば無料) *****

原則的に受けたほうがよいとされているものです。法律によって種類と対象者、接種期間が定められています。
病気にかかりやすい時期を考慮して望ましい接種時期の期間中にできるだけ接種しましょう。

| ワクチン | 対象年齢 (対象年齢内の接種は無料) | | 望ましい時期 | 間隔 | 回数 |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---|----|
| ロタウイルス (ロタリックス・ロタテック) ※どちらか一方を接種 | ロタリックス 出生6週0日～出生24週0日 | | 出生2か月から | 27日以上の間隔をおく ※初回接種を14週6日までに行う | 2回 |
| | ロタテック 出生6週0日～出生32週0日 | | 出生2か月から | 27日以上の間隔をおく ※初回接種を14週6日までに行う | 3回 |
| Hib(ヒブ) | 初回 | 生後2か月から 60か月未満 | 接種開始が生後2か月 から7か月未満 | 27日以上(標準的には56日まで)の間隔をおく (生後12か月までに3回接種) | 3回 |
| | 追加 | | | 初回終了後、7か月以上 (標準的には13か月まで)の間隔をおく | 1回 |
| 小児肺炎球菌 | 初回 | 生後2か月から 60か月未満 | 接種開始が生後2か月 から7か月未満 | 27日以上の間隔をおく (標準的には生後12か月までに3回接種) | 3回 |
| | 追加 | | 生後12か月から15か月 未満 | 初回終了後、60日以上の間隔をおく (生後12か月以降に行うこと) | 1回 |
| B型肝炎 | 1回目 | 1歳未満 | 生後2か月から 9か月未満 | — | 1回 |
| | 2回目 | | | 1回目終了後、27日以上の間隔をおく | 1回 |
| | 3回目 | | | 1回目終了後、139日以上の間隔をおく | 1回 |
| 四種混合 (ジフテリア) (百日せき) (破傷風) (ポリオ) | 1期 初回 | 生後3か月から 90か月未満 | 生後3か月から 12か月未満 | 20日以上(標準的には56日まで)の間隔をおく | 3回 |
| | 1期 追加 | | 1期初回終了後12か月 から18か月未満 | 1期初回終了後、6か月以上の間隔をおく | 1回 |
| BCG(結核) | 1歳未満 | | 生後5か月から8か月 未満 | — | 1回 |
| 麻しん・風しん (MR) | 1期 | 生後12か月から 24か月未満 | — | — | 1回 |
| | 2期 | 5歳以上7歳未満で、 小学校就学前の1年間 | | | 1回 |
| 水痘 | 1回目 | 生後12か月から | 生後12か月から 15か月未満 | — | 1回 |
| | 2回目 | 36か月未満 | 1回目終了後6か月から 12か月未満 | 1回目終了後、3か月以上の間隔をおく | 1回 |
| 日本脳炎 | 1期初回 | 生後6か月から 90か月未満 | 3歳 | 6日以上(標準的に28日まで)の間隔をおく | 2回 |
| | 1期追加 | | 4歳 | 1期初回終了後、6か月以上 (標準的におおむね1年)の間隔をおく | 1回 |
| | 2期 | 9歳以上13歳未満 | 9歳 | — | 1回 |
| 二種混合 (ジフテリア) (破傷風) | 2期 | 11歳以上13歳未満 | 11歳 | — | 1回 |
| 子宮頸がん(HPV) (サーバリックス・ガーダシル) ※どちらか一方を接種 | 小学校6年生～ 高校生1年生相当の女子 | | 中学1年生 | <サーバリックス> 1か月以上あけて2回、1回目から5か月以上 かつ2回目から2か月半以上あけて1回 <ガーダシル> 1か月以上開けて2回、2回目から3か月以上 あけて1回 | 3回 |

★1 Hib(ヒブ)及び小児肺炎球菌ワクチンは、望ましい接種時期以外に接種を開始した場合は接種回数が上記と異なります。

★2 日本脳炎の予防接種については、1995年(平成7年)4月2日～2007年(平成19年)4月1日に生まれた方は、日本脳炎の
予防接種を受ける機会を逃しているため、接種の特例として20歳未満までの間であれば定期予防接種ができます。